

## Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları

### *Lifestyle Behaviors, Food Consumption Frequencies and Risky Nutritional Habits in Oncology Patients Receiving Chemotherapy*

Derya Hopancı Bıçaklı<sup>1</sup>, Medine Yılmaz<sup>2</sup>

Geliş tarihi/Received: 19.10.2018 • Kabul tarihi/Accepted: 25.11.2018

#### ÖZET

**Amaç:** Kanserin hem oluşumu hem de tekrar etmesinde kontrol edilebilir bir risk etmeni olan bireysel yaşam tarzının önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı medikal onkoloji polikliniğinde kanser tanısıyla izlenen ve kemoterapi alan hastaların yaşam biçim davranışları ile besin tüketim çeşitlilikleri, sıklıkları ve riskli beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir.

**Bireyler ve Yöntem:** Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipteki bu araştırma, hastanemizin onkoloji polikliniğinde izlenen olasılıksız örneklem yöntemi ile araştırmaya katılmaya gönüllü 259 kanser hastası (yaş ortalaması 52.1 yıl, %64.5'i kadın, %35.5'i erkek) ile yürütülmüştür. Araştırmada “Yaşam Biçimi Aktiviteleri ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları Anketi” kullanılmıştır. Besin tüketim sıklıkları “hiç”, “ nadir”, “haftada bir” ve “her gün” olarak sınıflandırılmıştır. Wilcoxon testi kullanılmış ve  $p<0.05$  istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

**Bulgular:** Hastaların %50.6'sının egzersiz yapmadığı, %33.2'sinin obez olduğu, %55.6'sının da sağlığını kötü olarak algıladığı saptanmıştır. Hastaların %19.7'sinin fitoterapi, %19.3'ünün vitamin kullandığı ve kullananların %47.6'sının doktor/hemşire/diyetisyene danışmadan kullandığı görülmüştür. Hastaların kanser tanısı sonrasında tavuk eti, sosis-salam, sucuk, süt, kahve, çay, meşrubat, şeker ve bisküvi, diğer yağların (tereyağı, margarin, ayçiçek yağı) tüketim sıklığının azaldığı ( $p<0.05$ ), zeytinyağı tüketim sıklığının arttığı ( $p<0.05$ ) belirlenmiştir.

**Sonuç:** Çalışma bulguları kanser hastalarının beslenme durumunun belirlenerek sağlıklı yaşam biçimi kazandırmanın gerekliliğini ve riskli besinlerin tüketim sıklığının azaltılması konusunda eğitim verilmesinin önemini ortaya çıkarmıştır. Kanser tedavisi sırası ve sonrasında hastalar, yaşam biçimi alışkanlıkları ve beslenmeleri yönünden düzenli olarak izlenmelidir.

**Anahtar kelimeler:** Beslenme, onkoloji, kemoterapi, yaşam biçimi davranışları

#### ABSTRACT

**Aim:** The individual lifestyle, which is a controllable risk factor in both at the development and recurrence of cancer, is of great importance. The aim of this study was to investigate the lifestyle behaviors, dietary consumption, frequency and risky dietary habits of the patients who were followed up with the diagnosis of cancer in the medical oncology outpatient clinic.

**Subjects and Method:** This descriptive and comparative study was carried out on 259 cancer patients (mean age 52.1 years, 64.5% female, 35.5% male) who were volunteered to participate in the study with the probabilistic sampling method in the oncology outpatient clinic of our hospital. “Lifestyle Activities and Risky Eating Habits Questionnaire” was used in the study.

1. **İletişim/Correspondence:** Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye • E-posta: deryahopanci@hotmail.com  
• <https://orcid.org/0000-0003-1594-3266>

2. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
• <https://orcid.org/0000-0001-9409-6282>

Food consumption frequencies were classified as “none, rare, once a week and every day”. Wilcoxon test was used and a value of  $p < 0.05$  was considered as statistically significant.

**Results:** It was determined that 50.6% of patients did not exercise, 33.2% were obese and 55.6% perceived their health as bad. The frequency of phytotherapy and vitamin supplement use were 19.7% and 19.3%, respectively, and 47.6% of patients reported that they use these supplements without any consultation of their doctors/nurses/dietitians. Patients decreased the frequency of consumption of foods such as chicken, sausages-salami, Turkish sausage, milk, coffee, tea, soft drinks, sugar and biscuits, fats (butter, margarine, sunflower seed oil), and increased the frequency of olive oil consumption after they were diagnosed with cancer ( $p < 0.05$ ).

**Conclusion:** The findings of this study revealed the importance of providing of a healthy lifestyle accompanied with the evaluation of nutritional status, and giving education to cancer patients on reducing the consumption of risky foods.

**Keywords:** Nutrition, oncology, chemotherapy, healthy lifestyle

## GİRİŞ

Kanser kronik bir sağlık sorunu olarak çeşitli komplikasyonları beraberinde getirmekte, bu komplikasyonlara bağlı yetersizliğe/engelliliğe, işgücü kaybına neden olmaktadır. Kanserın bölgeler/ülkeler arası farklılık göstermesinin bireylerin tükettikleri besinler ve yaşam biçimleri gibi nedenlere bağlı olarak gelişebildiği bilinmektedir (1-3). Epidemiyolojik araştırmalar yaşam biçimi davranışlarının kanser oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (4). Tüm kanserlerin %85'inin yaşam tarzı ile ilişkili olduğu ve kontrol edilebilir bireysel alışkanlıklardan kaynaklandığı bildirilmektedir (5). Tütün ve alkol kullanımı, sedanter yaşam tarzı, obezite, kırmızı et, tuzlu ve tütülenmiş besin tüketiminin fazla olması, besinlere uygulanan yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri kanser oluşumu açısından risk oluşturabilmektedir (6-9). Bununla birlikte kanser tedavisi sırasında ve sonrasında, kanser nüksü, sekonder tümörlerin gelişimi ve kardiyovasküler hastalıklar açısından da risk oluşturmaya devam etmektedir (4,10,11).

Literatürde kanserın önlenmesinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemini (11-13), kanserden iyileşmiş hastalarda beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemi ile davranış değişimine yönelik girişimlerin etkisini inceleyen çalışmalar (14-16) ve sistematik derlemeler (17-19) olduğu görülmektedir. Buna karşılık kanser tedavisi aktif olarak devam eden

hastalarda yaşam biçimi davranışları, besin tüketim çeşitliliği ve sıklığı ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür (20).

Bu çalışmanın amacı, medikal onkoloji polikliniğinde kanser tanısıyla izlenen ve kemoterapi alan hastaların yaşam biçim davranışları ile besin tüketim sıklıkları ve riskli beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Bu araştırma bulgularının kanserli hastalara tedavileri sırasında ve sonrasında önerilecek yaşam biçimi alışkanlıklarına ilişkin eğitimler/girişimlere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırma soruları şunlardır: Kemoterapi alan hastaların “Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve riskli beslenme alışkanlıkları nelerdir?” ve “Tanı öncesi ve tanı sonrası besin tüketim çeşitlilikleri ve sıklıkları arasında fark var mıdır?”.

## BİREYLER VE YÖNTEM

### Araştırma Yeri ve Örnekleme

Tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı tipteki bu araştırma Ege Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji polikliniğinde yürütülmüştür. Araştırmanın örnekleme %95 güven aralığında, %5 hata payı ile 256 hasta olarak belirlenmiştir. Kanser tanısı ile medikal onkoloji polikliniğinde kemoterapi tedavisi gören, genel durumu kötü olmayan, işitme ve konuşma

sorunu olmayan ve arařtırmaya katılmayı kabul eden, 18 yař ve üzeri hastalar arařtırmaya alınmıřtır. Relaps ve terminal dönemde olan, kemoterapi aldıęı sırada kendini iyi hissetmeyen hastalar arařtırmaya alınmamıřtır. Ayrıca bu arařtırmadan baęımsız olarak klinięin rutin uygulaması gereęi, tüm hastalar tanı aldıęı andan itibaren arařtırmacı olan diyetisyen tarafından standart eęitime tabi tutulmaktadır.

Ege Üniversitesi giriřimsel olmayan arařtırmalar etik kurulundan etik izin (26.02.2013 /no:13-1.1/15) alınmıřtır. Her hastadan görüřme öncesi bilgilendirilmiř gönüllü olur izni alınmıřtır.

### Veri Toplama

Arařtırmada literatür (2,3,21-25) doęrultusunda hazırlanan ve uzman görüřü (diyetisyen, onkoloji hemřiresi ve doktor) alınan “Yařam Biçimi ve Beslenme Alıřkanlıklarını Belirleme Formu” kullanılmıřtır. Formda sosyo-demografik ve saęlık/hastalık özelliklere iliřkin soruların (20 soru) yanı sıra farklı kanser tipleri için risk oluřturabilecek yařam biçimi davranıřlarına yönelik sorular (11 soru) da yer almıřtır. Ayrıca besin hazırlama ve saklama kořullarına iliřkin (21 soru) sorular sorulmuřtur. Hastaların boy uzunluęu (cm) ile vücut aęırlıęı (kg) ölçümleri baskül ve stadiometre ile yapılmıřtır. Vücut aęırlıęının, boy uzunluęunun metrekaresine bölünmesi [vücut aęırlıęı (kg)/boy(m<sup>2</sup>)] ile bireylerin beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıř ve Dünya Saęlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre deęerlendirilmiřtir (26).

### Verilerin İstatistiksel Deęerlendirmesi

İstatistiksel analizler SPSS 22.0 paket programında yapılmıřtır. Verilerin analizinde sayı (n) ve yüzde (%) daęılımları kullanılmıřtır. Besin tüketim sıklıklarının tanı öncesi ve sonrası daęılım farklarını belirlemek için Wilcoxon analizi kullanılmıřtır. İstatistiksel analiz için ayda bir ve 15 günde bir tüketenler bir grupta, her gün ve haftada 3-4 kez tüketenler dięer grupta deęerlendirilmiřtir. İstatistik olarak p<0.05 anlamlı kabul edilmiřtir.

## BULGULAR

Çalıřmada deęerlendirilen 259 hastanın ortanca yařı 52.1 yıl (18-83 yıl), %64.1'i kadın, %35.5'i erkektir. Arařtırmaya katılan hastaların %51.0'i ilköęretim mezunudur. Hastaların %48.5'i sedanter bir iř yapmıř/yapmaktadır. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiřtir.

**Tablo 1.** Bireylerin demografik özelliklerine göre daęılımı (n=259)

Özellikler	n	%
<b>Cinsiyet</b>		
Kadın	167	64.5
Erkek	92	35.5
<b>Eęitim durumu</b>		
Okur-yazar deęil	15	5.8
İlk-orta öęretim	132	51.0
Lise	64	24.7
Yüksekokul/fakülte	48	18.5
<b>Çalıřma aktivitesi*</b>		
Aktif	118	51.5
Sedanter	111	48.5
<b>Gelir gider durumu</b>		
Geliri giderinden az	69	26.6
Geliri giderine eřit	152	58.7
Geliri giderinden fazla	38	14.7

\*n=229

Hastaların saęlık ve hastalık özelliklerine iliřkin bulguları Tablo 2'de gösterilmiřtir. Buna göre hastaların %34.4'ünün aęız diř saęlıęı sorunu olduęu, %19.3'ünün halen alkol kullandıęı, %50.6'sının egzersiz yapmadıęı, sadece %25.5'inin düzenli egzersiz yaptıęı belirlenmiřtir. Beden kütle indeksleri (BKİ) deęerlendirildięinde %34.0'ü kiloludur. Bireylerin %55.6'sı ise saęlıęını kötü olarak algılamaktadır (Tablo 2).

Hastaların riskli besin tüketim özellikleri ve fitoterapi/vitamin kullanma durumlarının daęılımı Tablo 3'te gösterilmiřtir. Buna göre, hastaların %19.7'sinin fitoterapi kullandıęı, kullananların da %47.6'sının saęlık çalıřanlarına danıřmadan kullandıęı belirlenmiřtir. Hastaların %19.3'ü vitamin kullandıęını belirtmiřtir. Hastaların %31.7'si yemeklere tuz eklemektedir, %42.1'i beyaz ekmek tüketmektedir (Tablo 3).

**Tablo 2.** Sağlık ve hastalık özelliklerine ilişkin bulgularının dağılımı (n=259)

Özellikler	n	%
<b>Kanser tipi</b>		
Meme	69	26.7
Kolon	55	21.2
Over	16	6.2
Mide	16	6.2
Diğer	103	39.7
<b>Ailede kanser öyküsü</b>		
Var	142	54.8
<b>Kronik hastalık varlığı</b>		
Var	79	30.5
<b>Ağız-diş sağlığı sorunu</b>		
Var	89	34.4
<b>Sigara içme durumu</b>		
Halen içiyor	16	6.2
Bırakmış	117	45.2
Hiç içmemiş	126	48.6
<b>Alkol kullanma durumu</b>		
Halen kullanıyor	50	19.3
Bırakmış	26	10.0
Hiç kullanmamış	183	70.7
<b>Egzersiz yapma</b>		
Yapmıyor	131	50.6
Ara sıra	62	23.9
Düzenli	66	25.5
<b>BKİ sınıflaması*</b>		
<18.5 kg/m <sup>2</sup> (Zayıf)	14	5.5
18.5 -24.99 kg/m <sup>2</sup> (Normal)	117	45.2
25-29.99 kg/m <sup>2</sup> (Kilolu)	86	34.0
30 kg/m <sup>2</sup> ve üzeri (Şişman)	42	16.6
<b>Sağlığı algılama</b>		
Çok kötü	41	15.8
Kötü	144	55.6
Orta	33	12.7
İyi	41	15.8

\*BKİ: Beden kütle indeksi

**Tablo 3.** Hastaların riskli besin tüketim özellikleri ve fitoterapi/vitamin kullanma durumlarının dağılımı (n=259)

Besin tüketim özellikleri	n	%
<b>Fitoterapi kullanımı</b>		
Kullanmıyor	208	80.3
Kullanıyor	51	19.7
<b>Doktorla paylaşma durumu</b>		
Paylaşmamış	24	47.6
Paylaşmış	27	10.4
<b>Vitamin kullanımı</b>		
Kullanıyor	50	19.3
Kullanmıyor	208	80.7
<b>Salamura besin tüketimi</b>		
Tüketmiyor	100	38.6
Tüketiyor	159	61.4
<b>Acı biber tüketimi</b>		
Tüketmiyor	132	51.0
Tüketiyor	127	49.0
<b>Mangalda et tüketimi</b>		
Tüketmiyor	86	33.2
Tüketiyor	173	66.8
<b>Yanmış besin tüketimi</b>		
Tüketmiyor	148	57.2
Tüketiyor	111	42.9
<b>Sıcak içecek tüketimi</b>		
Tüketmiyor	138	53.3
Tüketiyor	121	46.7
<b>Şeker ekleme</b>		
Hayır	116	44.8
Evet	143	55.2
<b>Sofra tuzu ekleme</b>		
Hayır	177	68.4
Evet	82	31.7
<b>Ekmek tipi tercihi</b>		
Beyaz ekmek	109	42.1
Çok tahıllı	69	26.6
Kepekli	48	18.5
Diğer	35	12.7

Hastaların besin hazırlama ve saklama koşullarına ilişkin bulgularının dağılımı Tablo 4'te gösterilmiştir. Hastaların %63.3'ü kızartma tüketmekte, %18.9'u kızartma yağını iki ve daha fazla kez kullanmakta, %61.4'ü kuru baklagillerin

haşlama suyunu dökmekte, %39.8'i sebzeleri kavurarak pişirmektedir. Hastaların %43.2'si beslenmenin kanser ile ilişkili olduğuna ve %38.6'sı obezitenin kanser ile ilişkili olduğuna inanmaktadır (Tablo 4).

**Tablo 4.** Besin hazırlama ve saklama koşullarına ilişkin bulgular (n=259)

Uygulamalar	n	%
<b>Kızartma tüketimi</b>		
Hiç tüketmiyor	95	36.7
Tüketiyor	164	63.3
<b>Kızartma yağı kullanım sayısı</b>		
1 kez	210	81.1
2 ve üzeri	49	18.9
<b>Kurubaklagillerin haşlama suyunu dökme</b>		
Dökmeyen	100	38.6
Döken	159	61.4
<b>Sebze pişirme</b>		
Çiğden	142	53.8
Kavurarak	103	39.8
Her ikisi de	14	5.4
<b>Kışık besin saklama şekli*</b>		
Konserve	35	14.6
Kurutma	30	11.6
Dondurma	106	44.2
Karışık	69	28.7
<b>Mikrodalga kullanımı</b>		
Hayır	201	77.6
Evet	58	22.4
<b>Küflü besin tüketimi</b>		
Hayır	248	95.8
Evet	11	4.2
<b>Baharat kullanımı</b>		
Tazeliğine dikkat etmeyen	69	26.6
Tazeliğine dikkat eden	188	72.6
<b>Beslenme ve kanser ilişkisine inanma</b>		
Hayır	81	31.3
Evet	112	43.2
Emin değil	66	25.5
<b>Obezite ve kanser ilişkisine inanma</b>		
Hayır	86	33.2
Evet	100	38.6
Emin değil	73	28.2

\*n=240

Bireylerin besin gruplarına göre tanı öncesi ve sonrası tüketim sıklıkları Tablo 5'te görülmektedir. Tavuk, hindi, salam, sosis, tereyağı, margarin, ayçiçek yağı, çay, kahve, şeker, meşrubat, bisküvi, gofret tüketim sıklığı anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.01). Tanıdan

sonra hiç süt ürünü tüketmeyenlerin sıklığında artış olduğu görülmüştür (p<0.05). Tanı öncesine göre her gün zeytinyağı tüketenlerin sıklığı artarken, diğer yağlar (tereyağı, margarin, ayçiçek yağı) açısından her gün tüketenlerin sıklığı azalmıştır (p<0.05). Benzer şekilde hastaların tanıdan sonra su tüketim miktarlarının 1.5 L ve üzerine çıktığı belirlenmiştir (p<0.05).

## TARTIŞMA

Kanser, küresel ve büyüyen bir sorundur. Sadece demografik değişim değil, aynı zamanda yaşam biçimine ilişkin artan risk etmenleri de mevcut kanser yüküne katkıda bulunmaktadır (27). Medikal onkoloji polikliniğinde kanser tanısıyla izlenen ve kemoterapi alan hastaların yaşam biçim davranışları ile besin tüketim çeşitlilikleri, sıklıkları ve riskli beslenme alışkanlıklarının incelendiği bu çalışmada hastaların kanser tanısından önce beyaz ekmek, şeker ve katı yağ, kızartma, salamura, mangalda et tüketimlerinin fazla, beyaz et ve su tüketimlerinin az olduğu saptanmıştır. Her iki hastadan birisinin sigara içtiği/bıraktığı ve egzersiz yapmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte tanı sonrası tükettikleri besin çeşitliliği ve sıklığının da değiştiği görülmüştür.

Fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini olumlu etkilediği ve tedaviyi tamamlamış kanser hastalarının yönetim planlarına entegre edilebileceği belirtilmektedir (11,28). Fiziksel aktivite yetersizliğinin sarkopeni nedenlerinden biri olduğu, bu durumun post-operatif komplikasyonlar, kemoterapi kaynaklı toksisite ve sağ-kalımın azalması ile anlamlı ilişki içinde olduğu belirtilmiştir (29). Fiziksel aktivite yetersizliğinin meme kanseri vakalarının %9'una ve kolon kanseri vakalarının %10'una neden olduğu düşünülmektedir (11). Bu çalışmada hastaların yarısının fiziksel aktivite yapmadığı sadece dört hastadan birisinin düzenli egzersiz yaptığı saptanmıştır. Fiziksel aktivite yapma oranının düşük olması hastaların daha çok 65 yaş ve üzeri grupta olması ile ilişkili olabilir. Avrupa Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (European Society For Clinical Nutrition and Metabolism-

Tablo 5. Besin gruplarının tanımdan önce (TÖ) ve tanımdan sonra (TS) tüketim sıklığına göre dağılımları (n=259)

Besin grupları	Hiç		Ayda bir		Haftada 1 kez		Haftada 3-4 kez		İstatistik*	
	TÖ	TS	TÖ	TS	TÖ	TS	TÖ	TS		
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
<b>Et ve ürünleri</b>										
Kırmızı et	12 (4.6)	21 (8.1)	39 (27.5)	67 (25.9)	92 (35.5)	99 (38.2)	84 (32.4)	72 (27.8)		p>0.05
Beyaz et (tavuk, hindi)	12 (4.6)	33 (12.7)	51 (19.7)	50 (19.3)	188 (42.5)	104 (40.2)	84 (33.1)	72 (27.8)		Z=-3.856, p=0.000
Balık	20 (2.2)	23 (8.9)	86 (33.2)	61 (23.5)	124 (47.9)	136 (52.5)	29 (11.2)	37 (14.3)		p>0.05
Sosis-salam	157 (60.6)	212 (81.9)	63 (23.5)	37 (14.6)	34 (8.1)	7 (2.7)	20 (7.7)	3 (1.2)		Z=-4.578, p=0.000
Sucuk	56 (21.7)	128 (49.8)	110 (42.6)	92 (35.8)	65 (25.2)	32 (12.5)	27 (10.5)	5 (2.0)		Z=-5.984, p=0.000
Yumurta	6 (2.3)	10 (3.9)	17 (6.6)	11 (4.2)	54 (20.8)	25 (9.7)	182 (70.4)	210 (82.3)		p>0.05
<b>Süt ve ürünleri</b>										
Peynir	4 (1.5)	8 (3.1)	5 (2.0)	5 (2.0)	6 (2.3)	4 (1.5)	244 (94.2)	251 (93.4)		p>0.05
Süt	62 (23.9)	87 (33.6)	55 (21.3)	44 (17.0)	44 (17.0)	32 (12.4)	98 (37.8)	96 (37.0)		Z=-2.437, p=0.015
Yoğurt	4 (1.5)	9 (3.5)	9 (3.5)	8 (3.1)	16 (6.2)	17 (6.6)	230 (88.8)	225 (86.9)		p>0.05
<b>Yağ tüketimi</b>										
Zeytinyağı	12 (4.6)	9 (3.5)	7 (2.7)	3 (1.2)	13 (5.0)	5 (1.9)	227 (87.7)	242 (93.4)		Z=-2.027, p=0.043
Tereyağı	44 (17.0)	68 (26.3)	52 (20.1)	50 (19.3)	30 (11.6)	30 (11.6)	123 (51.4)	111 (42.9)		Z=-2.542, p=0.011
Margarin	153 (59.1)	191 (73.7)	43 (16.6)	34 (13.1)	21 (8.1)	12 (4.6)	42 (16.2)	22 (12.5)		Z=-4.225, p=0.000
Ayçiçek/mısırözü	55 (21.2)	82 (31.7)	60 (23.1)	56 (21.7)	32 (12.4)	27 (10.4)	169 (32.4)	94 (36.3)		Z=-3.294, p=0.001
<b>Diğer ürünler</b>										
Meyve	5 (1.9)	6 (2.3)	13 (5.0)	8 (3.0)	12 (4.6)	9 (3.5)	229 (88.4)	236 (91.1)		p>0.05
Çiğ sebze	6 (2.3)	14 (5.4)	10 (3.8)	10 (3.9)	23 (8.9)	25 (9.7)	220 (85.0)	210 (81.1)		p>0.05
Pişmiş sebze	1 (0.4)	6 (2.3)	11 (4.3)	11 (4.2)	32 (12.4)	33 (12.7)	215 (83.0)	209 (80.7)		p>0.05
Kurubaklagiller	6 (2.3)	22 (8.5)	49 (18.9)	48 (18.5)	157 (60.6)	147 (56.8)	47 (18.2)	42 (16.2)		p>0.05
Tahıllar	4 (1.5)	9 (3.5)	24 (9.3)	17 (6.6)	38 (14.7)	42 (16.2)	193 (74.5)	191 (73.7)		p>0.05
Kahve	39 (15.1)	79 (30.5)	51 (19.7)	62 (23.9)	32 (12.4)	30 (11.6)	137 (52.9)	88 (34.0)		Z=-3.743, p=0.000
Çay (açık-demli)	10 (3.9)	32 (12.4)	5 (2.0)	10 (3.9)	5 (1.9)	9 (3.5)	239 (92.3)	208 (80.3)		Z=-3.392, p=0.001
Meşrubat	89 (34.4)	152 (58.7)	69 (26.7)	62 (23.9)	40 (15.4)	24 (9.3)	61 (23.6)	21 (8.1)		Z=-6.500, p=0.000
Şeker	51 (19.7)	98 (37.8)	13 (5.0)	19 (7.3)	10 (3.9)	7 (2.7)	185 (71.5)	135 (52.1)		Z=-5.096, p=0.000
Bal	40 (15.4)	54 (20.8)	51 (19.7)	39 (15.1)	35 (13.5)	24 (9.3)	133 (51.4)	112 (54.8)		p>0.05
Pekmez	71 (27.4)	77 (29.7)	66 (25.5)	50 (19.3)	35 (13.5)	35 (13.5)	87 (33.6)	97 (37.5)		p>0.05
Bisküvi/gofret vb.	66 (25.5)	106 (40.9)	66 (25.5)	57 (22.0)	50 (19.3)	40 (15.4)	77 (29.8)	56 (19.7)		Z=-3.510, p=0.000
Su (>1.5 litre)	50 (19.3)	41 (16.2)	21 (8.1)	18 (7.9)	16 (6.2)	8 (3.1)	172 (66.4)	191 (73.8)		Z=-2.04, p=0.041

\* Wilcoxon, TÖ:Tanımdan önce, TS:Tanımdan sonra

ESPEN)-2017 önerilerinde fiziksel aktiviteyi arttırmaya odaklanan, bireyselleştirilmiş beslenme müdahalelerini önermiştir (30). Bu durumda hastalar, tanıdan itibaren bireysel özelliklerine uygun fiziksel aktivitelerini arttırmaları ve durumlarına uygun egzersiz programlarına katılmaları konusunda teşvik edilmelidir.

Vücut ağırlığı denetimi kanser açısından önem taşımaktadır (21). Obezite, endometriyum, hepatoselüler ve postmenopozal meme kanserinde risk artışının anahtar etmenidir (23,31). Bu çalışmada hastaların yaklaşık yarısının kilolu ve obez olduğu saptanmıştır. Dikkat çeken bir diğer nokta ise hastaların %38.6'sının obezite ile kanser arasında pozitif bir ilişki olduğuna inanmalarındır.

Alkollü içecek tüketiminin birçok kanser türünün oluşum riskini arttırdığı bilinmektedir (12). Premalign ve invaziv meme kanseri için en tutarlı diyet risk etmeninin alkol olduğu bildirilmektedir (23,32). Bu çalışmada da yaklaşık beş hastadan birisinin halen alkol kullandığı belirlenmiştir. Bu yönüyle hastalara alkolün kanser ile ilişkisi yönünde farkındalıkları arttırılarak, alkol bırakma terapilerine yönlendirmek yararlı olacaktır.

Aşırı tuzlu veya salamura besinlerin fazla miktarlarda tüketimi özofagus ve mide kanseri riskini, aşırı sıcak içecek tüketimi ise ağız boşluğu, farinks ve özofagus kanseri riskini arttırmaktadır (22). Bu araştırma sonuçları hastaların salamura besin tüketmeleri ve tuz eklenmesi uygulamaları, mangalda pişmiş besinler ile aşırı sıcak ve şekerli içecekler tüketmeleri, diyetlerinin posa içeriğinin düşük olması gibi riskli beslenme alışkanlıklarına sahip olduklarını göstermiştir. Bu durum geleneksel kültürel beslenme alışkanlıklarının etkisini yansıtmaktadır. Ayrıca bu çalışmada hastaların yarıdan fazlasının pişirme yöntemi olarak kızartmayı ve beşte birinin kızartma yağını birden çok kez kullandıkları, kuru baklagillerin haşlama suyunu dökmek gibi vitamin kayıplarına neden olan olumsuz pişirme tekniklerini uyguladıkları görülmüştür. Heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak

bilinen karsinojenik bileşikler balık, tavuk etinin ve protein içeren diğer besinlerin yüksek sıcaklıklarda kızartılması ile oluşmaktadır (33). Kızartma yöntemi ile beslenmenin prostat, pankreas, akciğer, oral/faringeal, özofagus ve laringeal kanserler ile ilişkili olduğu bilinmektedir (34). Bu konudaki hasta bakış açısı değerlendirildiğinde hastaların %43'ünün beslenme ile kanser arasında doğrudan ilişki olduğuna inandığı belirlenmiştir. İnandıkları konu ile ilgili olarak davranış değişikliğine gidilmesi konusunda eğitim verilmesi önemlidir.

Kanser hastaları arasında tamamlayıcı alternatif tedavi uygulayanların oranı %77'yi bulmaktadır (35). Bu çalışmada ise her beş hastadan birisinin fitoterapi kullandığı bulunmuştur. Bu noktada önemsenmesi gereken durumlardan biri hastaların sağlık çalışanlarına danışmadan fitoterapi kullanmalarındır. Bazı bitki ve meyvelerin içerdiği flavonoidler ilaç metabolizmasına katılan sitokrom P450, p-glikoproteinler ve Faz-II enzimlerin etkinliğini değiştirebilirler (36). Bu çalışmada hastaların yaklaşık beşte birinin diyetine ek olarak vitamin kullandığı belirlenmiştir. Kanser hastalarında vitamin ve mineral miktarlarının günlük alım önerilerine göre sağlanması ve anlamlı eksiklikler yoksa yüksek doz mikro besin ögesi desteklerinden kaçınılması gerektiği belirtilmektedir (37).

Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Kanser Önleme Önerileri'nde kırmızı ve işlenmiş etten kaçınma, alkollü içecekleri ve tuz tüketimini sınırlama önerilerine yer verilmiştir (25). Meyve, sebze ve tam tahıllı, kepekli besinlerin yüksek alımını öneren diyet modellerinin kanser riskini azalttığı belirtilmiştir (13,23). Bu çalışmada her gün çiğ ve pişmiş sebze ve meyve tüketenlerin oranının sevindirici şekilde yüksek olduğu, tanıdan sonra bu oranların değişmediği görülmüştür. Kolorektal kanserli hastaların %10'undan daha azının günde beş porsiyon sebze-meyve tükettiği belirlenmiştir (38). Hastalara tanıdan itibaren sağlıklı beslenme konularında eğitim ve danışmanlık yapılması hem tedavi sürecinin daha konforlu geçirilmesi hem de tedavi sonrası nüksün önlenmesi açısından yararlı olacaktır.

Kanser tedavisi sırasında yeterli protein alımını karşılamak için en iyi seçenek, doymuş yağ az miktarda içeren besinlerdir (25). Bu araştırmada hastaların tanı öncesi ve sonrası kırmızı et tüketim sıklıklarının değişmediği, beyaz et tüketim sıklıklarının azaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte hem tanı öncesi hem tanı sonrasında hastaların önemli bir bölümünün kurubaklagilleri sık tükettiği, düzenli yoğurt ve peynir tüketimlerinin olduğu, işlenmiş et ürünleri (sosis, salam, sucuk) tüketimlerini azalttıkları, riskli bazı besinleri diyetten çıkarmış olmaları sevindiricidir. Hastaların tanıdan sonra günde >1.5 litre su içme sıklığı artmış olsa da bu oran onkoloji hastaları için yeterli bulunmamıştır. Bununla birlikte hiç su içmeyen hasta oranı da azımsanamayacak düzeyde çoktur. Hastaların tanıdan sonra tereyağı, şeker, çay, kahve, meşrubat tüketim sıklığı azalmış, zeytinyağı tüketim sıklığı artmıştır. Bu olumlu değişikliklerin hasta ve hasta yakınlarının beslenmeye karşı artan ilgisinin yanı sıra tanı anında aldıkları rutin sağlıklı beslenme eğitimi ve diyet danışmanlığının etkisi olabileceği düşünülmüştür. Amerika’da yapılan bir çalışmada kanser tanısından sonra hastaların %66.3’ünün yaşam tarzı değişiklikleri yaptığı, %40.4’ünün bir veya daha fazla diyet değişikliği yaptığı, %20.8’inin yeni bir fiziksel aktiviteye başladığı belirtilmiştir (39). Kanser tiplerine özgü sağlıklı yaşam biçimi ve beslenme davranışları girişimlerin etkinliğini gösterecek uzunlamasına çalışmalar planlanmalıdır.

Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, hastaların tanı öncesi dönemdeki uygulamaları subjektif yanıtları içerecek şekilde soru yanıt yoluyla elde edilmiş olup hastaların geçmiş hatırlamalarıyla yakından ilişkili olmasıdır. Bu durumun araştırma bulgularını etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma örnekleminin yaş aralığının 18-83 yıl arasında değişim göstermesi, yaşın hem fiziksel aktivite düzeyi ve sağlık özellikleri hem de besin tüketim sıklığını etkileyebilecek önemli bir değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmaya bir kontrol grubu alınmamış olması nedeniyle elde edilen sonuçların sağlıklı toplumun genelinden farklı olup olmadığı yorumlanamamıştır.

Hastalara uygulanan anket hazırlanırken besin çeşitleri ve tüketim sıklıkları sorgulanmıştır. Sonraki çalışmalar da bunlara ek olarak miktarların da sorgulanması daha kapsamlı bilgi verebilir.

Sonuç olarak kanser hastalarının sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıkları, besin tüketim çeşitlilikleri ve sıklıklarının hem hastalığın oluşumunda hem de tedavi süreçlerinde büyük önemi vardır. Kanseri önleme çalışmalarında riskli beslenme alışkanlıklarının hastalığı başlatan süreçlere katkısı olduğu sağlıklı popülasyona anlatılmalı ve konuyla ilgili ülke politikaları geliştirilmelidir. Hastaların tanı öncesi ve sonrası süreçlerdeki beslenme davranış değişikliklerinin iyi yönetilebilmesi için tüm kanser hastaları onkolojik tedaviyle paralel ilerleyen beslenme eğitimlerine alınmalı ve düzenli aralıklarla dikkatle izlenmelidir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılması, kanser açısından riskli besinlerin tüketilmesi ve hazırlanma şekillerinin değiştirilmesi, tedavi sürecinde olduğu kadar hastalısız sağ-kalımda da önemli noktalardan biridir.

**Çıkar çatışması • Conflict of interest:** *Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler. • The authors declare that they have no conflict of interest.*

## KAYNAKLAR

1. Jemal A, Bray F, Center MM. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 2011;61:69-90.
2. Fu Z, Shrubsole MJ, Smalley WE, Wu H, Chen Z, Shyr Y, et al. Lifestyle factors and their combined impact on the risk of colorectal polyps. *Am J Epidemiol* 2012;176(9):766-76.
3. De Stefani E, Deneo-Pellegrini H, Ronco AL, Boffetta P, Correa P, Aune D. Meat consumption, cooking methods, mutagens, and risk of squamous cell carcinoma of the esophagus: A case-control study in Uruguay. *Nutr Cancer* 2012;64(2):294-9.
4. Meyerhardt JA, Niedzwiecki D, Hollis D, Saltz LB, Hu FB, Mayer RJ, et al. Association of dietary patterns with cancer recurrence and survival in patients with stage III colon cancer. *JAMA*; 298(7):754-64.
5. Barclay V. Basic Concepts in Cancer Nursing. Platin N, editor. 1st ed. Ankara, Turkey, Turkish Association for Cancer Research and Control; 1987. p. 11-36.
6. Chan AT, Giovannucci EL. Primary prevention of



- colorectal cancer. *Gastroenterology* 2010;138(6):2029-43.
7. Yıldız E. Kanser ve Beslenme. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları. Erişim: <https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t58.pdf> Erişim Tarihi: 2.12.2018.
  8. Parsa P, Parsa B. Effects of reproductive factors on risk of breast cancer: a literature review. *Asian Pac J Cancer Prev* 2009;10(4):545-50.
  9. Arafa MA, Waly MI, Jriesat S, Al Khafajei A, Sallam S. Dietary and lifestyle characteristics of colorectal cancer in Jordan: a case-control study. *Asian Pac J Cancer Prev* 2011;12(8):1931-6.
  10. Kenfield SA, Van Blarigan EL, Stampfer MJ, Chan JM. Diet and exercise in cancer: Epidemiologic perspectives on optimizing survivorship via lifestyle. *J Cancer Policy* 2018;17:30-3.
  11. Leitzmann M, Powers H, Anderson AS, Scoccianti C, Berrino F, Boutron-Ruault MC, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Physical activity and cancer. *Cancer Epidemiol* 2015;39(Suppl 1):46-55.
  12. Latino-Martel P, Cottet V, Druesne-Pecollo N, Pierre FH, Touillaud M, Touvier M, et al. Alcoholic beverages, obesity, physical activity and other nutritional factors, and cancer risk: A review of the evidence. *Crit Rev Oncol Hematol* 2016;99:308-23.
  13. Norat T, Scoccianti C, Boutron-Ruault MC, Anderson A, Berrino F, Cecchini M, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Diet and cancer. *Cancer Epidemiol* 2015;39(Suppl 1):56-66.
  14. James EL, Stacey FG, Chapman K, Boyes AW, Burrows T, Girgis A, et al. Impact of a nutrition and physical activity intervention (ENRICH: Exercise and Nutrition Routine Improving Cancer Health) on health behaviors of cancer survivors and carers: a pragmatic randomized controlled trial. *BMC Cancer* 2015;15:710.
  15. Pelsler C, Arem H, Pfeiffer RM, Elena JW, Alfano CM, Hollenbeck AR, et al. Prediagnostic lifestyle factors and survival after colon and rectal cancer diagnosis in the National Institutes of Health (NIH)-AARP Diet and Health Study. *Cancer* 2014;120(10):1540-7.
  16. Stacey FG, James EL, Chapman K., Courneya KS, Lubans DR. A systematic review and meta-analysis of social cognitive theory-based physical activity and/or nutrition behavior change interventions for cancer survivors. *J Cancer Surviv* 2015;9(2):305-38.
  17. Van Blarigan EL, Meyerhardt JA. Role of physical activity and diet after colorectal cancer diagnosis. *J Clin Oncol* 2015;33(16):1825-34.
  18. Limon-Miro AT, Lopez-Teros V, Astiazaran-Garcia H. Dietary guidelines for breast cancer patients: A critical review. *Adv Nutr* 2017;8(4):613-23.
  19. Spencer JC, Wheeler SB. A systematic review of motivational interviewing interventions in cancer patients and survivors. *Patient Educ Couns* 2016;99(7):1099-105.
  20. Ellis KR, Janevic MR, Kershaw T, Caldwell CH, Janz NK, Northouse L. Engagement in health-promoting behaviors and patient-caregiver interdependence in dyads facing advanced cancer: an exploratory study. *J Behav Med* 2017;40(3):506-19.
  21. Kushi LH, Doyle C, McCullough M, Rock CL, Demark-Wahnefried W, Bandera EV, et al. American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Activity Guidelines Advisory Committee. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. *CA Cancer J Clin* 2012;62(1):30-67.
  22. Key TJ, Schatzkin A, Willett WC, Allen NE, Spencer EA, Travis RC. Diet, nutrition and the prevention of cancer. *Public Health Nutr* 2004;7(1A):187-200.
  23. Kerr J, Anderson C, Lippman SM. Physical activity, sedentary behaviour, diet, and cancer: an update and emerging new evidence. *Lancet Oncol* 2017;18(8):457-71.
  24. Baysal A. Beslenme. 12. Baskı. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi; 2012.
  25. Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, Meyerhardt J, Courneya KS, Schwartz AL, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. *CA Cancer J Clin* 2012;62(4):243-74.
  26. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation Vol. 916. Geneva, 2003.
  27. Vineis P, Wild CP. Global cancer patterns: causes and prevention. *Lancet* 2014;383(9916):549-57.
  28. Mishra SI, Scherer RW, Snyder C, Geigle P, Gotay C. Are exercise programs effective for improving health-related quality of life among cancer survivors? A systematic review and meta-analysis. *Oncol Nurs Forum* 2014;41(6):326-42.
  29. Pamoukdjian F, Bouillet T, Lévy V, Soussan M, Zelek L, Paillaud E. Prevalence and predictive value of pre-therapeutic sarcopenia in cancer patients: A systematic review. *Clin Nutr* 2018;37(4):1101-13.
  30. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. *Clin Nutr* 2017;36(5):1187-96.
  31. Anderson AS, Key TJ, Norat T, Scoccianti C, Cecchini M, Berrino F, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Obesity, body fatness and cancer. *Cancer Epidemiol* 2015;39(Suppl 1):34-45.
  32. Albuquerque RCR, Baltar VT, Marchioni DML. Breast

- cancer and dietary patterns: a systematic review. *Nutr* 2017;36(5):1187-96.
33. Sinha R. An epidemiologic approach to studying heterocyclic amines. *Mutat Res* 2002;506-507:197-204.
34. Stott-Miller M, Neuhouser ML, Stanford JL. Consumption of deep-fried foods and risk of prostate cancer. *Prostate* 2013;73(9):960-9.
35. Huebner J, Prott FJ, Micke O, Muecke R, Senf B, Dennert G, et al. PRIO (Working Group Prevention and Integrative Oncology - German Cancer Society). Online survey of cancer patients on complementary and alternative medicine. *Oncol Res Treat* 2014;37(6):304-8.
36. Kale A, Gawande S, Kotwal S. Cancer phytotherapeutics: role for flavonoids at the cellular level. *Phytother Res* 2008;22(5):567-77.
37. Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. *Clin Nutr* 2017;36(1):11-48.
38. Shaffer KM, Kim Y, Llabre MM, Carver CS. Dyadic associations between cancer-related stress and fruit and vegetable consumption among colorectal cancer patients and their family caregivers. *J Behav Med* 2016;39(1):75-84.
39. Patterson RE, Neuhouser ML, Hedderson MM, Schwartz SM, Standish LJ, Bowen DJ. Changes in diet, physical activity, and supplement use among adults diagnosed with cancer. *J Am Diet Assoc* 2003;103(3):323-8.